

| | | |
|-----------------------|--|--|
| ロタウイルス 感染症 | ロタリックス(1価) ワクチンの場合 生後24週まで | 1回目 2回目 生後6週 27日以上 生後24週まで ※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日) |
| | ロタテック(5価) ワクチンの場合 生後32週まで | 1回目 2回目 3回目 生後6週 27日以上 27日以上 生後32週まで ※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日) ※2回目は生後28週までに行う |

| | |
|---------------------|--|
| B型肝炎 1歳未満 | 1回目 2回目 3回目 1歳未満 27日以上 1回目から139日(約5か月)以上の間隔をあける ※標準的な接種期間は、生後2か月から生後9か月までの間 |
|---------------------|--|

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| Hib (インフルエンザ菌b型) 2か月～5歳未満 | 初回接種が2か月～7か月未満 (合計4回) ※1 | 2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 5歳未満 27日～56日 27日～56日 初回終了後、7か月以上13か月未満 |
| | 初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※1 | 7か月以上 初回1 初回2 追加 5歳未満 27日～56日 初回終了後、7か月以上13か月未満 |
| | 初回接種が1歳～5歳未満 (合計1回) | 1歳以上 1回 5歳未満 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|--|
| 小児 肺炎球菌 2か月～5歳未満 | 初回接種が2か月～7か月未満 | 2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 5歳未満 27日以上 27日以上 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に |
| | 初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※2 | 7か月以上 初回1 初回2 追加 5歳未満 27日以上 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に |
| | 初回接種が1歳～2歳未満 (合計2回) | 1歳以上 1回目 2回目 5歳未満 60日以上 |
| | 初回接種が2歳～5歳未満 | 2歳以上 1回 5歳未満 |

| | |
|---|---|
| 四種混合 百日せき・ジフテリア 破傷風・不活化ポリオ 2か月から 7歳6か月未満 | 2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 7歳6か月未満 20日～56日 20日～56日 初回終了後、12か月以上18か月未満 ※追加接種は6か月以上あけると接種可能 |
|---|---|

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| B C G 5か月～1歳未満 | 5か月以上 1回 1歳未満 ※標準的な接種期間は、5か月～8か月 |
|--------------------------|-------------------------------------|

| | |
|----------------------|---|
| 水痘 1歳～3歳未満 | 1歳 初回 追加 3歳未満 初回終了後、6か月以上12か月未満 ※追加接種は3か月以上あけると接種可能 |
|----------------------|---|

ヒブ・肺炎

※1 初回2回目・3回目は1歳を超えると接種できません。
(追加接種は可能だが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上(医師が必要と認めた場合は20日)の間隔をおく)

※2 初回2回目・3回目は2歳を超えると接種できません。また、初回2回目が1歳を超えた場合は、3回目を接種できません。

| | | |
|------------------------|----------------------|---|
| 麻しん風しん (MR) | 1期 1歳～2歳未満 | 1歳以上 1回 2歳未満 |
| | 2期 5歳～7歳未満 | 5歳以上 1回 7歳未満 ※小学校入学前の1年間(年度内に6歳になる方) |

| | | |
|-------------|--------------------------|---|
| 日本脳炎 | 1期 6か月～7歳6か月未満 | 6か月以上 初回1 初回2 追加 7歳6か月未満 6日～28日 おおむね12か月後 ※標準的な接種期間は、3歳から7歳6か月未満だが、生後6か月から接種可能 ※追加接種は6か月以上あけると接種可能 |
| | 2期 9歳～13歳未満 | 9歳以上 1回 13歳未満 |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 二種混合 ジフテリア・破傷風 11歳～13歳未満 | 11歳以上 1回 13歳未満 |
|---------------------------------------|----------------|

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| 子宮頸がん HPV ヒトパピローマウイルス | サークリアックス (2価ワクチン) | 12歳になる年度初日 1回目 2回目 3回目 16歳になる年度末 1か月以上 1回目から6か月以上の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1月以上の間隔において2回接種後、1回目の接種から5月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔において1回接種が可能 | シルガード (9価ワクチン) | 15歳未満(2回) 12歳になる年度初日 1回目 2回目 16歳になる年度末 1回目から6か月～12か月の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、初回接種から少なくとも5か月以上の間隔において1回接種が可能 ※15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了が可能です |
| | ガーダシル (4価ワクチン) | 12歳になる年度初日 1回目 2回目 3回目 16歳になる年度末 2か月以上 1回目から6か月以上の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1月以上の間隔において2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔において1回接種が可能 | 15歳以上(3回) 12歳になる年度初日 1回目 2回目 3回目 16歳になる年度末 2か月以上 1回目から6か月以上の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1月以上の間隔において2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔において1回接種が可能 | |