

ロタウイルス 感染症	ロタリックス(1価) ワクチンの場合	生後6週 1回目 2回目 生後24週まで 27日以上 ※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)
	ロタテック(5価) ワクチンの場合	生後6週 1回目 2回目 3回目 生後32週まで 27日以上 27日以上 ※1回目は生後6週～14週6日までに行う ※2回目は生後28週までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)

B型肝炎 1歳未満	1回目 2回目 3回目 1歳未満 27日以上 1回目から139日(約5か月)以上の間隔をあける ※標準的な接種期間は、生後2か月から生後9か月までの間
--------------	--

Hib (インフルエンザ菌b型) 2か月～5歳未満	初回接種が2か月～7か月未満 (合計4回) ※1	2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 5歳未満 27日～56日 27日～56日 初回終了後、7か月以上13か月未満
	初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※1	7か月以上 初回1 初回2 追加 5歳未満 27日～56日 初回終了後、7か月以上13か月未満
	初回接種が1歳～5歳未満 (合計1回)	1歳以上 1回 5歳未満

小児 肺炎球菌 2か月～5歳未満	初回接種が2か月～7か月未満	2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 5歳未満 27日以上 27日以上 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に
	初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※2	7か月以上 初回1 初回2 追加 5歳未満 27日以上 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に
	初回接種が1歳～2歳未満 (合計2回)	1歳以上 1回目 2回目 5歳未満 60日以上
	初回接種が2歳～5歳未満	2歳以上 1回 5歳未満

四種混合 百日せき・ジフテリア 破傷風・不活化ポリオ 3か月から 7歳6か月未満	3か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 7歳6か月未満 20日～56日 20日～56日 初回終了後、12か月以上18か月未満 ※追加接種は6か月以上あけると接種可能
--	--

BCG 5か月～1歳未満	5か月以上 1回 1歳未満 ※標準的な接種期間は、5か月～8か月
-----------------	-------------------------------------


水痘 1歳～3歳未満	1歳 初回 追加 3歳未満 初回終了後、6か月以上12か月未満 ※追加接種は3か月以上あけると接種可能
---------------	---

麻しん風しん (MR)	1期 1歳～2歳未満	1歳以上 1回 2歳未満
	2期 5歳～7歳未満	5歳以上 1回 7歳未満 ※小学校入学前の1年間(年度内に6歳になる方)

日本脳炎	1期 6か月～7歳6か月未満	6か月以上 初回1 初回2 追加 7歳6か月未満 6日～28日 おおむね12か月後 ※標準的な接種期間は、3歳から7歳6か月未満だが、生後6か月から接種可能 ※追加接種は6か月以上あけると接種可能
	2期 9歳～13歳未満	9歳以上 1回 13歳未満

二種混合 ジフテリア・破傷風 11歳～13歳未満	11歳以上 1回 13歳未満
--------------------------------	----------------

子宮頸がん HPV ヒトパピローマウイルス	2価ワクチンの場合	12歳になる年度初日 1回目 2回目 3回目 16歳になる年度末日 1か月以上 2か月半以上 5か月以上
	4価ワクチンの場合	12歳になる年度初日 1回目 2回目 3回目 16歳になる年度末日 1か月以上 3か月以上 6か月以上



※1 初回2回目・3回目は1歳を超えると接種できません。
(追加接種は可能だが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上(医師が必要と認めた場合は20日)の間隔をおく)

※2 初回2回目・3回目は2歳を超えると接種できません。また、初回2回目が1歳を超えた場合は、3回目を接種できません。
(どちらも追加接種は可能)

日本脳炎の有効期限の延長について
平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は、日本脳炎1期および2期予防接種を20歳まで接種することができます。平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれの方は、日本脳炎1期予防接種を9歳から13歳未満においても接種することができます。有効期限の延長を

