

ロタウイルス 感染症	ロタリックス(1価) ワクチンの場合 生後24週まで	<p>生後6週 1回目 2回目 生後24週まで</p> <p>27日以上</p> <p>※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)</p>
	ロタテック(5価) ワクチンの場合 生後32週まで	<p>生後6週 1回目 2回目 3回目 生後32週まで</p> <p>27日以上 27日以上</p> <p>※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)</p> <p>※2回目は生後28週までに行う</p>

B型肝炎 1歳未満	<p>1回目 2回目 3回目 1歳未満</p> <p>27日以上</p> <p>1回目から139日(約5か月)以上の間隔をあける</p> <p>※標準的な接種期間は、生後2か月から生後9か月までの間</p>
--------------	---

Hib (インフルエンザ菌b型) 2か月～5歳未満	初回接種が2か月～7か月未満 (合計4回) ※1	<p>2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 5歳未満</p> <p>27日～56日 27日～56日 初回終了後、7か月以上13か月未満</p>
	初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※1	<p>7か月以上 初回1 初回2 追加 5歳未満</p> <p>27日～56日 初回終了後、7か月以上13か月未満</p>
	初回接種が1歳～5歳未満 (合計1回)	<p>1歳以上 1回 5歳未満</p>

小児 肺炎球菌 2か月～5歳未満	初回接種が2か月～7か月未満 (合計4回) ※2	<p>2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 5歳未満</p> <p>27日以上 27日以上 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に</p>
	初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※2	<p>7か月以上 初回1 初回2 追加 5歳未満</p> <p>27日以上 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に</p>
	初回接種が1歳～2歳未満 (合計2回)	<p>1歳以上 1回目 2回目 5歳未満</p> <p>60日以上</p>
	初回接種が2歳～5歳未満 (合計1回)	<p>2歳以上 1回 5歳未満</p>

四種混合 百日せき・ジフテリア 破傷風・不活化ポリオ 2か月から 7歳6か月未満	<p>2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 7歳6か月未満</p> <p>20日～56日 20日～56日 初回終了後、12か月以上18か月未満</p> <p>※初回接種の標準的な接種期間は、生後2か月から生後12か月までの間</p> <p>※追加接種は6か月以上あけると接種可能</p>
--	---

五種混合 百日せき・ジフテリア 破傷風・不活化ポリオ・Hib 2か月から 7歳6か月未満	<p>2か月以上 初回1 初回2 初回3 追加 7歳6か月未満</p> <p>20日～56日 20日～56日 初回終了後、6か月以上18か月未満</p> <p>※初回接種の標準的な接種時期: 生後2か月から生後7か月までに開始</p>
--	---

BCG 5か月～1歳未満	<p>5か月以上 1回 1歳未満</p> <p>※標準的な接種期間は、5か月～8か月</p>
-----------------	--

水痘 1歳～3歳未満	<p>1歳 初回 追加 3歳未満</p> <p>初回終了後、6か月以上12か月未満</p> <p>※追加接種は3か月以上あけると接種可能</p>
---------------	--

麻しん風しん (MR)	1期 1歳～2歳未満	<p>1歳以上 1回 2歳未満</p>
	2期 5歳～7歳未満	<p>5歳以上 1回 7歳未満</p> <p>※小学校入学前の1年間(年度内に6歳になる方)</p>

日本脳炎	1期 6か月～7歳6か月未満	<p>6か月以上 初回1 初回2 追加 7歳6か月未満</p> <p>6日～28日 おおむね12か月後</p> <p>※標準的な接種期間は、3歳から7歳6か月未満だが、生後6か月から接種可能</p> <p>※追加接種は6か月以上あけると接種可能</p>
	2期 9歳～13歳未満	<p>9歳以上 1回 13歳未満</p>

二種混合 ジフテリア・破傷風 11歳～13歳未満	<p>11歳以上 1回 13歳未満</p>
--------------------------------	-----------------------

子宮頸がん HPV ヒトパピローウイルス	(2価ワクチン)	<p>12歳になる年度初日 1回目 2回目 16歳になる年度末</p> <p>1か月以上</p> <p>1回目から6か月以上の間隔をあける</p> <p>※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1月以上の間隔において2回接種後、1回目の接種から9月以上、かつ2回目の接種から2月半以上の間隔において1回接種が可能</p>	(9シールワクチン)
	(4価ワクチン)	<p>12歳になる年度初日 1回目 2回目 16歳になる年度末</p> <p>2か月以上</p> <p>1回目から6か月以上の間隔をあける</p> <p>※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1月以上の間隔において2回行った後、2回目の接種から3月以上の間隔において1回接種が可能</p>	

Hib

※1 初回2回目・3回目は1歳を超えると接種できません。
(追加接種は可能だが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上(医師が必要と認めた場合は20日)の間隔をおく)

肺炎球菌

※2 初回2回目・3回目は2歳を超えると接種できません。また、初回2回目1歳を超えた場合は、3回目を接種できません。
(どちらも追加接種は可能)

五種混合

※3 すでにHibワクチンまたは四種混合ワクチンで接種を開始している場合、残りの接種について、原則として五種混合ワクチンは使用できません。接種を開始しているワクチンと同じワクチンで残りの回数も接種します。