

ロタウイルス 感染症	ロタリックス(1価) ワクチンの場合 生後24週まで	1回目 生後6週 2回目 27日以上 ※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)	2回目 生後24週まで	
	ロタテック(5価) ワクチンの場合 生後32週まで	1回目 生後6週 2回目 27日以上 ※1回目は生後6週～14週6日までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)	3回目 27日以上 ※2回目は生後28週までに行う (初回標準接種期間 生後2か月～14週6日)	生後32週まで
B型肝炎 1歳未満	1回目 27日以上 ※1回目から139日(約5か月)以上の間隔をあける ※標準的な接種期間は、生後2か月から生後9か月までの間	2回目 27日以上 3回目 1歳未満		
Hib (インフルエンザ菌b型) 2か月～5歳未満	初回接種が2か月～7か月未満 (合計4回) ※1 2か月以上 27日～56日 初回1 初回2 初回3 初回終了後、7か月以上13か月未満	追加 5歳未満		
	初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※1 7か月以上 27日～56日 初回1 初回2 初回終了後、7か月以上13か月未満	追加 5歳未満		
	初回接種が1歳～5歳未満 (合計1回) 1歳以上	1回 5歳未満		
小児 肺炎球菌 2か月～5歳未満	初回接種が2か月～7か月未満 (合計4回) ※2 2か月以上 27日以上 初回1 初回2 初回3 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に	追加 5歳未満		
	初回接種が7か月～1歳未満 (合計3回) ※2 7か月以上 27日以上 初回1 初回2 初回終了後、60日以上あけて1歳以上に	追加 5歳未満		
	初回接種が1歳～2歳未満 (合計2回) 1歳以上	1回目 2回目 60日以上		
	初回接種が2歳～5歳未満 (合計1回) 2歳以上	1回 5歳未満		
四種混合 ジフテリア・百日咳 破傷風・不活化ボツリヌス 2か月から 7歳6か月未満	初回1 2か月以上 20日～56日 初回2 20日～56日 初回3 初回終了後、12か月以上18か月未満	追加 7歳6か月未満		※初回接種の標準的な接種期間は、生後2か月から生後12か月までの間
五種混合 ジフテリア・百日咳 破傷風・不活化ボツリヌス・Hib 2か月から 7歳6か月未満	※3 初回1 2か月以上 20日～56日 初回2 20日～56日 初回3 初回終了後、6か月以上18か月未満	追加 7歳6か月未満		※初回接種の標準的な接種時期:生後2か月から生後7か月までに開始
B C G 5か月～1歳未満	1回 1歳未満			
	※標準的な接種期間は、生後5か月から生後8か月までの間			
水痘 1歳～3歳未満	初回 1歳 追加 3歳未満			
	初回終了後、6か月以上12か月未満			
	※追加接種は3か月以上あけると接種可能			
麻しん風しん (MR)	1期 1歳～2歳未満 1歳以上 1回 2歳未満		H i b	※1 初回2回目・3回目は1歳を超えると接種できません。 (追加接種は可能だが、初回接種の最後の注射終了後、27日以上(医師が必要と認めた場合は20日)の間隔をおく)
	2期 5歳～7歳未満 5歳以上 1回 7歳未満			※2 初回2回目・3回目は2歳を超えると接種できません。また、初回2回目が1歳を超えた場合は、3回目を接種できません。 (どちらも追加接種は可能)
日本脳炎	1期 6か月～7歳6か月未満 6か月以上 初回1 6日～28日 初回2 おおむね12か月後 ※標準的な接種期間は、3歳から7歳6か月未満だが、生後6か月から接種可能 ※追加接種は6か月以上あけると接種可能	追加 7歳6か月未満	五 種 混 合	※3 すでにHibワクチンまたは四種混合ワクチンで接種を開始している場合、残りの接種について、原則として五種混合ワクチンは使用できません。接種を開始しているワクチンと同じワクチンで残りの回数も接種します。
	2期 9歳～13歳未満 9歳以上 1回 13歳未満			
二種混合 ジフテリア・破傷風 11歳～13歳未満	11歳以上 1回 13歳未満			
子宮頸がん HPV ヒトパピローマウイルス	（サバニナルクシズ） 12歳になる 年度初日 1回目 2回目 3回目 1か月以上 1回目から6か月以上の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1ヶ月以上の間隔をおいて2回接種後、1回目の接種から5ヶ月以上、かつ2回目の接種から2ヶ月半以上の間隔をおいて1回接種が可能	（9シルワクチンド） 15歳 未満 2回 1回目 2回目 16歳になる 年度末日 1回目から6か月～12か月の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、初回接種から少なくとも5ヶ月以上の間隔をおいて1回接種が可能 ※15歳になるまでの間に1回目の接種を行えば、2回での接種完了が可能です		
	（ガロダクシル） 12歳になる 年度初日 1回目 2回目 3回目 2か月以上 1回目から6か月以上の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとることができない場合は、1ヶ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3ヶ月以上の間隔をおいて1回接種が可能	（9シルワクチンド） 15歳 以上 3回 1回目 2回目 3回目 16歳になる 年度末日 1回目から6か月以上の間隔をあける ※ただし、当該接種方法をとことができない場合は、1ヶ月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の接種から3ヶ月以上の間隔をおいて1回接種が可能		